



HISTOFINE

**2009年10月改訂

*2006年 4月改訂

2005年 6月作成

体外診断用医薬品

*クラスⅢ免疫組織学検査用シリーズ
ヒストファイン SAB-PO(R)キット
(シリーズ共用試薬)

第二抗体

ビオチン標識抗ウサギIgG抗体

(動物種：ヤギ)

包装： 50 テスト (6mL) Code : 426011
150 テスト (17mL) Code : 426012

製造販売元

株式会社ニチレイバイオサイエンス

〒104-8402

東京都中央区築地6-19-20

TEL. 03(3248)2208 FAX. 03(3248)2243

*■本品は、クラスⅢ免疫組織学検査用シリーズ ヒストファイン SAB-PO(R)キットの構成試薬 第二抗体であり、補充用に使用するものである。

*■本品を使用する際は、ヒストファイン SAB-PO(R)キットおよび各構成製品の第一抗体の添付文書をよく読んで使用すること。各構成製品名は末尾の記載を参照すること。

1.内容

第二抗体・・・ビオチン標識抗ウサギ IgG 抗体 (動物種：ヤギ)。

液状。

1%ウシ血清アルブミンと 0.1%アジ化ナトリウムを含むリン酸緩衝生理食塩水 (PBS,pH7.4) にて、即時使用可能な抗体濃度に希釀済み。

1バイアル中に 6mL または 17mL を含む。

2.使用方法

第一抗体の添加、反応、洗浄の後、スライド上の組織切片が完全に覆われるよう第二抗体を 2 滴(100μL)滴下し、常温(15-25°C)で 10 分間反応させる。

3.使用上又は取扱上の注意

ヒト由来の検体は、取扱者に感染をひき起こす危険性がある。従って、適切な取扱および廃棄法を用いるとともに、この免疫組織（細胞）化学染色法を施行するに際し、関連技術および操作法に充分習熟しておかなければならない。

4.貯法

2-8°Cで保存。

(ヒストファイン SAB-PO(R)キットの構成製品名) **

α1-アンチキモトリップシン (AACT)、α1-アンチトリプシン (α1-AT)、第VII因子関連抗原 (VII R:Ag)

α-フェトプロテイン (AFP)、グリア線維性酸性プロテイン (GFAP)、グルカゴン

ケラチン/サイトケラチン、リゾチーム/ムラミダーゼ、ニューロン特異エノラーゼ

S-100 タンパク、ゾマトスタチン、サイログロブリン