

体外診断用医薬品

ご使用の前に必ず電子添文をお読みください。


承認番号 : 22300AMX00503000

A群ベータ溶血連鎖球菌抗原キット

イムノファイン™ ストレップA

【操作方法】 テストプレート、試薬A入りスクイズチューブ、試薬Bは15~30℃に戻してからご使用ください。

■ 検体の調製



■ 測定

スクイズチューブの検体抽出液を、テストプレートの検体滴下部に2滴、滴下します。滴下チップが検体滴下部に触れないよう、垂直に滴下してください。



■ 判定

1~5分

陽性判定



5分

陰性判定



再検査




検体抽出液を滴下してから 5 分以内に判定部 C に赤紫色のラインが認められない場合には、判定せず、再検査を実施してください。

1 - 5分後、判定部 T、C のラインの出現の有無を目視にて確認してください。
注) 10分を超えて判定をしないでください。

【検体の採取方法】

咽頭ぬぐい液



キット付属の滅菌綿棒を使用し、咽頭後部、扁桃、その他炎症部分を擦って咽頭粘液を採取します。

多量の粘液（唾液、鼻汁など）が検体に含まれると、反応に悪影響を与え、正しい判定結果が得られない原因となることがあります。

多量の粘液の採取を避けるため、綿球が舌、頬の表面、歯、歯肉に触れないように充分注意してください。

出典：イムノファイン™ ストレップA 電子添文より

製造販売元 **N** 株式会社ニチレイバイオサイエンス
〒104-8402 東京都中央区築地6-19-20

【問い合わせ先】 株式会社ニチレイバイオサイエンス
問い合わせフォーム : <https://nichireibiosciences.co.jp/contactlist/>
問い合わせ電話番号 : 03-3248-2228
問い合わせ受付時間 : 9:00~17:00 (土日祝日を除く)
ホームページ : <https://nichireibiosciences.co.jp>