



研究用試薬

ヒストファイン

第一抗体

抗 CA19-9 モノクローナル抗体(AT 用)

(動物種：マウス)

包装： 50 テスト (6.5mL)

Code： AT1381-1

製造販売元

株式会社ニチレイバイオサイエンス

〒104-8402

東京都中央区築地 6-19-20

TEL. 03(3248)2208 FAX. 03(3248)2243

■本品は、自動染色装置ヒストステイナーAT用の試薬 第一抗体である。

■特異性および抗原分布：組織中のヒト CA19-9 抗原と反応する。Lewis^aおよび Lewis^b 血液型抗原は糖脂質や糖タンパク上のエピトープを形成する炭水化物であり、CA19-9 抗原は、Lewis^a 血液型抗原がシアリル化したルイス A(Lewis^a)5 単糖である。細胞膜や分泌物中に存在し、正常では乳腺、腎臓、唾液腺、汗腺の導管、肺の気管支上皮、大腸の管腔上皮、前立腺の導管上皮に反応がみられる。腫瘍では、胃、腸および膵臓の腺癌を含む消化管腫瘍の大部分に反応がみられ、また、肺腺癌、扁平上皮癌、および小細胞癌を含む肺腫瘍全般においても反応がみられる。中皮腫では反応はみられない。

■クローン名：C241:5:1:4

■抗体のサブクラス：IgG1

■免疫原：ヒト結腸直腸癌培養細胞株 COLO 205

■製法：ハイブリドーマの培養上清より得ている。

1. 内容

第一抗体・・・抗 CA19-9モノクローナル抗体(動物種：マウス)。

液状。

ウシ血清アルブミン(BSA)と 0.1%アジ化ナトリウムを含むリン酸緩衝生理食塩水(PBS)にて、即時使用可能な抗体濃度に希釈済み。

1 バイアル中に 6.5mL を含む。

2. 使用目的

組織・細胞中の CA19-9 の染色。

3. 使用方法

パラフィン包埋切片の免疫組織化学染色および免疫細胞化学染色に使用できる第一抗体である。

1) 他の試薬とともに試薬ラック(AT用)にセットし、染色を開始する。

2) 染色終了後、すみやかに2-8℃に保存する。

4. 染色方法の設定

試薬の反応温度、反応時間を下記に設定する。

《タイプ：HRP Heat》

プロトコル名	Dewax	TR	温度(℃)	ブロッキング	試薬名	第一抗体 反応時間(分)	第一抗体 反応温度 (℃)
CA19-9-AT	Dewax2-AT	TRpH9-AT	101	Buffer	CA19-9-AT	20	25

5. 貯法および使用上の注意

1. 2-8℃保存。

2. 使用期限はラベルに記載されているので使用前に確認すること。

3. 使用後は速やかに冷蔵保存すること。

4. 異なるロットの試薬や他製品の試薬を混ぜたりしないこと。

6. 取扱上(危険防止)の注意

1. 使用期限の過ぎた試薬は使用しないこと。
2. 本製品に関する安全情報は安全データシートを参照すること。
3. 本品を吸い込んだり、眼、口、皮膚、衣類などへの接触を避けること。
4. 本製品の廃棄の際には、各施設や地域および国のルールに従い、適切に廃棄すること。
5. 本品は、動物由来成分を含むので、取扱に注意が必要である。
6. 本品にはアジ化ナトリウムが含まれている。アジ化ナトリウムは水道管に含まれる銅、鉛との反応によって爆発の危険性があるので、多量の水とともに洗い流すこと。
7. ヒト由来の検体は、感染の恐れがあるので適切な取扱および廃棄法を用いるとともに、この免疫組織(細胞)化学染色法を施行するに際し、関連技術および操作法に充分習熟しておかなければならない。

7. 参考文献

- (1) C. Haglund, et al: Br. J. Cancer 60 : 845-851, 1989
- (2) P. Kuusela, et al: Br. J. Cancer 63 : 636-640, 1991
- (3) Christine P. Hans, et al: BLOOD 103:275-282,2004
- (4) Chunlin Ye, et al: Gynecologic Oncology 52 : 267-271, 1994

■ 研究用としてのみ使用すること。