



研究用試薬

ヒストファイン

第一抗体

抗 PAX8 ウサギモノクローナル抗体(QR016) (AT 用)

(動物種：ウサギ)

包装： 50 テスト (6.5mL)

Code： AT1839-1

製造販売元

株式会社ニチレイバイオサイエンス

〒104-8402

東京都中央区築地 6-19-20

TEL. 03(3248)2208 FAX. 03(3248)2243

- 本品は、自動染色装置ヒストステイナーAT用の試薬 第一抗体である。
- 特異性および抗原分布**：ヒト PAX8(paired box 8)タンパクの N 末端と特異的に反応する。PAX8 は、PAX 遺伝子ファミリーに属する転写因子で、腎臓の器官形成および甲状腺やミューラー管の発達において重要な機能をもつ⁽¹⁾⁽²⁾。正常では、腎臓、甲状腺、子宮内膜、卵管などの細胞の核に反応がみられる⁽²⁾⁽³⁾。腫瘍では、腎細胞癌、甲状腺癌、卵巣癌、子宮内膜癌などに反応がみられる⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾。肺腺癌、乳癌、胃癌、大腸癌などでは反応がみられない⁽²⁾⁽³⁾。PAX8 の発現を確認することは、腎臓、甲状腺、ミューラー管などから発生する原発性および転移性腫瘍の判別に有用である⁽³⁾。

注) PAX8 が発現している細胞では、核の他に細胞質にも弱～中程度の染色がみられることがある。

- クローン名：QR016
- 抗体のクラス/サブクラス：ウサギ IgG
- 免疫原：ヒト PAX8 に相当する合成ペプチド
- 製法：培養上清より、プロテイン A アフィニティークロマトグラフィーを用いて精製して得ている。

1. 内容

第一抗体・・・抗 PAX8 ウサギモノクローナル抗体(QR016)(動物種：ウサギ)。

液状。

ウシ血清アルブミン(BSA)と 0.1%アジ化ナトリウムを含むリン酸緩衝生理食塩水(PBS)にて、即時使用可能な抗体濃度に希釈済み。

1 バイアル中に 6.5mL を含む。

2. 使用目的

組織・細胞中の PAX8 タンパクの染色。

3. 使用方法

パラフィン包埋切片の免疫組織化学染色および免疫細胞化学染色に使用できる第一抗体である。

1) 他の試薬とともに試薬ラック(AT用)にセットし、染色を開始する。

2) 染色終了後、すみやかに2-8℃に保存する。

4. 染色方法の設定

試薬の反応温度、反応時間を下記に設定する。

《タイプ：HRP Heat》

プロトコル名	Dewax	TR	温度(℃)	ブロッキング	試薬名	第一抗体 反応時間(分)	第一抗体 反応温度(℃)
PAX8-AT	Dewax2-AT	TRpH9-AT	101	Buffer	PAX8-AT	20	25

■参考：上述の染色条件で良好な染色が得られない場合は、裏面を参照してください。

5. 貯法および使用上の注意

1. 2-8℃保存。
2. 使用期限はラベルに記載されているので使用前に確認すること。
3. 使用後は速やかに冷蔵保存すること。
4. 異なるロットの試薬や他製品の試薬を混ぜたりしないこと。

6. 取扱い上(危険防止)の注意

1. 使用期限の過ぎた試薬は使用しないこと。
2. 本製品に関する化学物質の安全情報は安全データシートを参照すること。
3. 本品を吸い込んだり、眼、口、皮膚、衣類などへの接触を避けること。
4. 本製品の廃棄の際には、各施設や地域および国のルールに従い、適切に廃棄すること。
5. 本品は、動物由来成分を含むので、取扱いに注意が必要である。
6. 本品にはアジ化ナトリウムが含まれている。アジ化ナトリウムは水道管に含まれる銅、鉛との反応によって爆発の危険性があるので、多量の水とともに洗い流すこと。
7. ヒト由来の検体は、感染の恐れがあるので適切な取扱いおよび廃棄法を用いるとともに、この免疫組織(細胞)化学染色法を施行するに際し、関連技術および操作法に充分習熟しておかなければならない。

7. 参考文献

- (1) Moretti L et al. N-terminal PAX8 polyclonal antibody shows cross-reactivity with N-terminal region of PAX5 and is responsible for reports of PAX8 positivity in malignant lymphomas. *Mod Pathol.* 2012 Feb;25(2):231-6.
- (2) Tacha D et al. Expression of PAX8 in normal and neoplastic tissues: a comprehensive immunohistochemical study. *Appl Immunohistochem Mol Morphol.* 2011 Jul;19(4):293-9.
- (3) Laury AR et al. A comprehensive analysis of PAX8 expression in human epithelial tumors. *Am J Surg Pathol.* 2011 Jun;35(6):816-26.
- (4) Tacha D et al. PAX8 mouse monoclonal antibody [BC12] recognizes a restricted epitope and is highly sensitive in renal cell and ovarian cancers but does not cross-react with b cells and tumors of pancreatic origin. *Appl Immunohistochem Mol Morphol.* 2013 Jan;21(1):59-63.

■ 研究用としてのみ使用すること。

■ 参考: 組織の固定状況等により、下記のいずれかまたは複数の染色条件を変更することで、良好な染色が得られる場合がある。

ただし、組織へのダメージや偽陽性化、偽陰性化が起こるおそれがあるため、研究者自身の責任において至適条件をよく検討すること。

■ 染色強度をより強くしたい場合

- ・抗原賦活化の「TR」を TRpH9-AT から TRtypeN-AT に変更する。
(TR-pH9(AT用)(Code: AT1534-1)の代わりに TR-typeN(AT用)(Code: AT1539-1)を用いる。)
- ・抗原賦活化の「温度(°C)」を 101°C から 103°C へ上げる。
- ・「第一抗体反応時間(分)」を 20 分から 30 分へ延長する。
- ・「第一抗体反応温度(°C)」を 25°C から 37°C へ上げる。
- ・抗原賦活化の処理時間を長くする。
注: 「TR」の試薬が、スライド 1 枚の染色に対して 2 テスト分必要になります。
(《タイプ: HRP Heat》の代わりに《タイプ: Special》に登録する。弊社にて登録、設定を行いますのでご連絡ください。)

■ 染色強度をより弱くしたい場合

- ・抗原賦活化の「TR」を TRpH9-AT から TRpH6-AT に変更する。
(TR-pH9(AT用)(Code: AT1534-1)の代わりに TR-pH6(AT用)(Code: AT1535-1)を用いる。)
- ・抗原賦活化の「温度(°C)」を 101°C から 96°C へ下げる。

■ 内因性ペルオキシダーゼに起因するバックグラウンド染色がみられる場合

- ・「ブロッキング」を Buffer から H2O2-AT に変更する。
(過酸化水素水(AT用)(Code: AT1524-1)を用いる。)